

## **NOTA TÉCNICA COVID-19 Nº 016/2021 - SESA/SSVS/GEVS/PEI**

Considerando que os estudos de soro conversão da vacina Coronavac (Sinovac/Butantan), Covishield (Oxford/Fiocruz) e Comirnaty (Pfizer/BioNTech) demonstraram resultados de melhor resposta imunológica com a adoção de intervalos maiores nos esquemas de vacinação, recomendamos:

- Vacina Coronavac (Sinovac/Butantan): intervalo entre as doses de 4 semanas (28 dias);
- Vacina Covishield (Oxford/Fiocruz): intervalo entre as doses de 10 semanas (70 dias);
- Vacina Comirnaty (Pfizer/BioNTech): intervalo entre as doses de 10 semanas (70 dias);

Recomendamos que os municípios operacionalizem a vacinação com intervalo de 10 semanas entre as doses vacina Covishield (Oxford/Fiocruz) e Comirnaty (Pfizer/BioNTech), a fim de garantirmos acesso aos cidadãos dentro do prazo recomendado.

Caso haja alguma ocorrência que impeça o indivíduo de retornar na data recomendada do intervalo do esquema, orienta-se vaciná-lo, mesmo em data posterior, assim que comparecer ao serviço de vacinação.

Vitória, 25 de agosto de 2021.

**NÉSIO FERNANDES DE MEDEIROS JUNIOR**  
Secretário de Estado da Saúde